

Herrn Prof. Dr. W. Kesselhelmen
hochachtungsvoll
d. Verf.

Ein Beitrag zur Lehre

von der

puerperalen Involution des Uterus.


Von

Leon Bernstein.

Dorpat.

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei.

1885.



Ein Beitrag zur Lehre
von der
puerperalen Involution des Uterus.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung des Grades eines

Doctors der Medicin

verfasst und mit Bewilligung

einer Hochverordneten Medicinischen Facultät der Kaiserl.
Universität zu Dorpat

zur öffentlichen Vertheidigung bestimmt

von

Leon Bernstein.

Rig.

Ordentliche Opponenten:

Doc. Dr. **L. Kessler.** — Prof. Dr. **R. Thoma.** — Prof. emer. Dr. **J. v. Holst.**

Dorpat.

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei.

1885.

Gedruckt mit Genehmigung der medicinischen Facultät.

Dorpat, den 23. Februar 1885.

Nr. 74.

Decan: L. Stieda.

MEINEN ELTERN

IN LIEBE UND DANKBARKEIT

gewidmet.

Beim Scheiden von der Alma Mater ist es mir eine liebe Pflicht allen meinen verehrten academischen Lehrern herzlichen Dank zu sagen für die vielfache Belehrung und wissenschaftliche Anregung, die sie mir haben zu Theil werden lassen.

Herrn Prof. Dr. L. Schenk, Director des Institutes für Embryologie und Histologie an der K. K. Universität zu Wien, unter dessen Leitung vorliegende Arbeit gemacht wurde, sowie Herrn Dr. W. Tinter, Professor der praktischen Geometrie und d. z. Rector am K. K. Polytechnikum zu Wien, der mich freundlichst bei meinen Messungen unterstützte, bitte ich meines besten Dankes versichert zu sein.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Einleitung.

Die nicht allzu große Reihe mikroskopischer Untersuchungen des Uterus während der puerperalen Involution eröffnet Franz M. Kilian in seiner vorzüglich gründlichen Arbeit: „Die Structur des Uterus bei Thieren“¹⁾.

Kilian fand zuerst bei der Untersuchung eines Kaninchen-Uterus 30—36 Stunden nach dem Wurf Fettkörnchen in den Zellen des epithelialen Ueberzugs des Uterus. Die Muskelfaser fand er „matter und blasser“ aussehend, als es in der Gravidität der Fall war, und in ihrem Innern sehr feine, glänzende Fettkügelchen in verschiedener Menge; neben diesen fettig zerfallenden Muskelfasern fand er einzelne ganz junge, wie er sie im Uterus junger Thiere gesehen hatte.

Ueber die Veränderungen des Bindegewebes zwischen den Muskelbündeln war es Kilian nicht möglich etwas Bestimmtes zu ermitteln, und läßt er es unentschieden, ob in diesem Gewebe überhaupt Veränderungen im Puerperium vor sich gehen. Sollte dieses der Fall sein, so ist, nach seiner Ansicht, entweder nur Schwinden der Breitendurchmesser der Bindegewebs-Fasern selbst, oder aber eine gänzliche Resorption derselben zu erwarten.

1) Henle und Pfeufer's Zeitschrift für rationelle Medicin 1849 u. 1850, Band VIII u. IX.

Bezüglich der puerperalen Involution der Uterus-schleimhaut sind die Untersuchungen von Kilian weniger vollständig; jedenfalls hat er in der Schleimhaut ebenfalls sehr stark ausgesprochenen fettigen Zerfall beobachtet und unter der degenerirten Schicht junges Bindegewebe und junge Utricular-Drüsen gefunden.

Zum Schlusse seiner Betrachtungen über den Involutions-Proceß stellt K. den Satz auf, das Gebärgorgan sei nach überstandnem Puerperium ein ganz neues, da sich die Muskel- und Schleimhautschicht nach der Geburt vollständig regeneriren.

An diese Untersuchungen schließt sich die Arbeit Hefschl's „Untersuchungen über das Verhalten des menschlichen Uterus nach der Geburt“¹⁾, an. Hefschl untersuchte hauptsächlich das Verhalten der Muskulatur im Puerperium und schildert es folgendermaßen: „An den einzelnen Muskelfibrillen beginnt ein fettiger Zerfall an sehr vielen Punkten zugleich, indem sich zuerst die geringe Schlingung der Fibrille verliert, die Contouren blasser werden, und (häufig reihenweise geordnete) gelbe Körnchen auftreten, die, da die Enden der einzelnen Faferzellen dünner sind, auch zu einer früheren Auflösung dieser führen. Der Kern derselben ist blafs, aber deutlich, bis ihn die zunehmende Menge der Fettkörnchen verdeckt“.

Hefschl spricht es, wie Kilian, strict aus, die Musculatur unterliege einer so vollständigen Umwandlung zu molecularem Fette, daß von dem früheren Uterus nach dem Puerperium nicht eine einzige Fafer zurückbleibe.

Die Entwicklung neuer, junger Musculatur beobachtete

1) Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien 1852, VIII, 2.

Hefchl dann gewöhnlich in der IV. Woche, zuerst im Corpus uteri. Er sah zuerst in den äußeren Muskelschichten Kerne, Zellen, endlich faserig sich ausziehende Zellen auftreten, die ganz die Form der nachherigen Muskelfasern annahmen und sich ihm daher als junge Uterinsubstanz auswiesen.

Kölliker¹⁾ meint, bei der puerperalen Involution des Uterus spiele offenbar eine Verkleinerung der contractilen Faserelemente in der Muskelschicht eine Hauptrolle, neben der die Fettbildung einhergehe, doch giebt er auch die Möglichkeit der vollständigen Auflösung gewisser Muskelfasern zu. Die Schleimhaut werde vollständig ausgestoßen und müsse sich vollständig neu bilden. Von der Serosa sagt Kölliker, sei es klar, daß sie sich zurückbilde, doch sei das Nähere nicht erforscht.

Friedländer²⁾ verdanken wir eine gründliche Bearbeitung und klare Darstellung des Verhaltens der Uterin-Schleimhaut im Puerperium.

Colin hatte in seiner Thèse „Etude à l'oeil nu sur la surface interne de l'utérus après l'accouchement“ auf der Muscularis des Uterus post partum eine 1 mm. dicke weiche Membran gefunden, aus der sich, seiner Ansicht nach, die Uteruschleimhaut regeneriren sollte. Die Entwicklung dieser Membran führt Coste (Thèse de M. A. Richard 1848) bis in den 4. Schwangerschaftsmonat zurück, und ihm schließt sich Kilian in der oben genannten Arbeit an.

Hefchl (l. c. und Compendium der allgemeinen und speciellen pathol. Anatomie. Wien 1855) stellt die Regeneration der Schleimhaut so dar, daß einige Tage nach der

1) Gewebelehre, 5. Aufl. p. 565 u. f.

2) Physiologisch-anatomische Untersuchungen über den Uterus, Leipzig 1870.

Geburt eine zuerst papierdünne, rothe, pulpöse Masse auf der Innenfläche des Uterus entsteht, welche, vom Cervicalcanal ausgehend, netzförmig nach und nach die ganze Uterushöhle bekleidet; dieses Netzwerk, dessen Maschen immer enger und enger werden und bald ganz verschwinden, sei die Grundlage für die neu zu bildende Schleimhaut.

Dagegen ist das Resultat der genauen Studien Friedländer's folgendes:

Die Decidua setzt sich, wie bekannt, am Ende der Schwangerschaft aus zwei Schichten zusammen: einer innern, wesentlich bindgewebigen Zellschicht und einer äußern Drüfenschicht. Bei der Lostrennung der Decidua während der Geburt wird nur der innere Theil der Zellschicht ausgestoßen; ihre äußern Partien, sowie die ganze Drüfenschicht, verbleiben post partum im Uterus, und an ihnen vollzieht sich der Involutionsproceß.

Zuerst zerfallen die Elemente der Zellschicht größtentheils durch fettige Metamorphose und stoßen sich ab; dabei schmilzt die ganze Zellschicht ein und geht in den Lochien ab. Die Drüsen der zweiten Schicht werden dadurch der Oberfläche immer mehr genähert und endlich freigelegt; ein Theil ihrer Epithelien wird nun ebenfalls abgestoßen, und auf diese Weise werden auf der Wundfläche epitheliale Elemente bloßgelegt, welche vorher in der Tiefe verborgen waren. Diese Epithelinseln werden, indem der Proceß weiter geht, immer zahlreicher; sie rücken durch fortschreitende Einschmelzung des zwischen ihnen liegenden Gewebes, sowie durch Verkleinerung der innern Oberfläche des ganzen Organs immer näher aneinander, berühren sich endlich und bilden so einen continuirlichen neuen Epithelüberzug über die Wundfläche.

Bei der Untersuchung des Bindgewebes der Schleim-

haut, zwischen den Drüsen, hat Friedländer in den Spindelzellen des Bindgewebes viele Fettkörnchen gefunden.

Die Untersuchungen Kundrats und Engelmanns¹⁾ Langhans' ²⁾, Leopolds ³⁾, und eine zweite Arbeit Friedländers⁴⁾ geben in allen wesentlichen Punkten, — wie ausdrücklich von den Autoren hervorgehoben wird, — dieselben Resultate über das Verhalten der Innenfläche des Uterus post partum, wie die erste Arbeit Friedländers.

Die Differenz der Befunde besteht darin, daß Friedländer die Trennungslinie zwischen dem mit den Eihäuten abgestoßenen Theile der Decidua und dem in utero restirenden durch die Zellschicht gehen läßt, während Langhans diesen Riss in die oberen Lagen der Drüfenschicht verlegt, wo wegen der dicht nebeneinander liegenden Hohlräume nur die dünnen Scheidewände durchtrennt zu werden brauchen.

Kundrat und Engelmann schildern den Vorgang ganz ähnlich wie Friedländer:

Auf der Innenfläche des Uterus fanden sie einen im Mittel 2 mm. dicken Rest von Decidua vera, der stellenweise die oberste Lage der Zellschicht fehlte. In den nächsten Wochen post partum verfetten die obersten Parteen der Schleimhaut, und legen sich dadurch die Drüsenfundi bloß; in ihnen geht eine Neubildung von Epithel vor sich; somit bilden nun die freigewordenen Drüsenfundi das neue Endometrium, das durch die weitere Entwicklung des Drüsenzwischengewebes und die dadurch bedingte Verlängerung

1) Wiener medicinische Jahrbücher 1873.

2) Archiv für Gynaekologie. B. 8.

3) „ „ „ 12.

4) „ „ „ 9.

und Streckung (Senkrechtfstellung) der Drüsen zur Norm zurückgeführt wird.

Leopolds Untersuchungen führen zu den gleichen Resultaten; sie sind an einem sehr reichen Material angestellt worden, wodurch es Leopold möglich wurde, die Involution der Schleimhaut Schritt für Schritt bis zur vollendeten Regeneration zu verfolgen.

Die größeren Arterien und Venen¹⁾ obliteriren durch Bindegewebswucherung der Intima, während in der Media derselben fettiger Zerfall eintritt.

In den Capillaren ist deutliche fettige Degeneration nachweisbar.

Aus obiger Zusammenstellung geht hervor, daß wir wol das scharfste und abgerundetste Bild von der Involution der Schleimhaut haben; bei der Musculatur tritt uns schon eine wesentliche Meinungsverschiedenheit zweier Autoren entgegen, und ist hier die Frage offen, ob die Musculatur im Puerperium ganz zu Grunde gehe, die des involvirten Uterus also eine ganz neue sei, wie es Hefschl annimmt, oder ob Köllickers Vermuthung, die Hauptrolle spiele eine Atrophie der contractilen Faserelemente, das Richtige treffe; das Bindegewebe gar ist von den Autoren recht stiefmütterlich behandelt worden, und hat in den 35 Jahren seit Kilian überhaupt Niemand es untersucht.

1) Balin, Archiv für Gynaekologie, Band 15.

Methode der Untersuchung.

Als ich, auf Veranlassung des Herrn Professor Dr. L. Schenk, daran ging, die puerperale Involution des Uterus mikroskopisch zu studiren, fiel mir sofort die quantitative Verschiedenheit im Verhalten des Bindegewebes der Uteruswand auf, und nahm ich mir vor, meine Aufmerksamkeit speciell dem Bindegewebe der Serosa zuzuwenden, um eventuell diese Lücke in der Kenntniß der puerperalen Involution auszufüllen.

Meine Untersuchungen habe ich, wie Kilian, am Kaninchen-Uterus gemacht. Selbst bei dem sehr großen geburtshilflichen Material in Wien ist es unmöglich, menschliche Uteri im Wochenbette zu studiren; denn, zum Glück, sterben ja die Wöchnerinnen recht selten; die Uteri der im Wochenbett gestorbenen sind ferner zur Untersuchung der im normalen Wochenbette an ihnen eintretenden Veränderungen meist unbrauchbar, da ja gerade eine Unterinerkrankung meist den Tod herbeigeführt hat; dann ist es, glaube ich, bei diesen Untersuchungen nothwendig, methodisch Tag für Tag den Uterus nach der Geburt zu untersuchen, da man nur aus einer größeren Reihe von Befunden, zwischen denen immer die gleiche kurze Zwischenzeit liegt, ein klares Bild der Veränderungen bekommen kann, -- diese Bedingung könnte aber wol selbst bei jahrelangem Aufspeichern

von Material an menschlichen Uteris nicht erfüllt werden; endlich liegt kaum ein Grund vor anzunehmen, daß der Proceß der puerperalen Involution am Kaninchen-Uterus sich irgend wesentlich von dem am menschlichen unterscheidet.

Ich untersuchte auf Schnitten, die senkrecht zur Axe des Uterushorns liegen, das Bindegewebe der Serofa und die kräftigen, deutlich hervortretenden Züge, die von der Serofa abgehen und die äußerste Muskelschicht der Uteruswand in Fächer theilen.

Den größten Theil meiner Untersuchungen konnte ich mit der gewöhnlich üblichen mikroskopischen Technik ausführen, nur für die quantitativen Bestimmungen schlug ich einen Weg ein, der, meines Wissens, bisher bei mikroskopischen Maßbestimmungen nicht betreten wurde, sich mir aber so gut bewährt hat, daß ich nicht umhin kann, ihn hier in Kürze zu beschreiben.¹⁾

Um die Menge des Bindegewebes, resp. der Musculatur in einem Präparate zu bestimmen, gieng ich folgendermaßen vor: Ein feiner Schnitt wurde mit Haematoxylin gefärbt ¹⁾, durch welchen Farbstoff das Bindegewebe intensiv dunkelviolett gefärbt wird, während die Musculatur hell bleibt. Dieses Präparat wird nun scharf im Mikroskop eingestellt und photographirt. Zum mikroskopischen Photographiren liefs ich mir in eine gewöhnliche photographische Camera obscura vorne, statt der Linse der Photographen, einen Metalltubus anbringen, der, nach Entfernung des Oculars, genau in den Tubus meines Mikroskops paßte; bei durchfallendem Lichte stellte ich nun das Bild des Präparates recht scharf

1) Am meisten hat sich mir nach vielem Suchen dieses Färbemittel zur Differenzirung bewährt, und zwar in einer stets frisch angefertigten wässerigen Lösung mit Zusatz von einigen Tropfen Ammoniak.

auf der Projectionsplatte dar und photographirte es dann auf einer Obernetter'schen Trockenplatte.

Da die Camera obscura und der Tubus des Mikroskops bei jeder Aufnahme gleich weit ausgezogen wurden, und stets dasselbe Objectiv angeschraubt war, so mußte das Photographum immer dieselbe Vergrößerung des Präparats ergeben. Nach kurzer Uebung im Einstellen des Bildes auf die Platte bekam ich sehr schöne, scharfe Aufnahmen.

Zur Messung benutzte ich nun, auf die Empfehlung des Herrn Prof. Dr. W. Tinter hin, das von Starke in Wien construirte Wetli-Planimeter, das an Genauigkeit der Messung Nichts zu wünschen übrig läßt. Auf jedem meiner Photographen von den verschiedenen Stadien der puerperalen Involution umfuhr ich mit dem Stifte des Planimeters ungefähr das gleiche Areal; darauf umfuhr ich das dunkle Feld des Bindegewebes in diesem Areal; — die Differenz beider Zahlen ergab mir die Fläche der Musculatur. Auf der Scheibe des Instruments lassen sich Zehntel eines Quadratmillimeters ablesen und Hundertstel taxiren.

Die Dicke der Serosa und der Züge bestimmte ich mittels des gewöhnlichen Mikrometeroculars.

Die Kaninchen, deren Uteri ich untersuchte, bezog ich alle aus derselben Zucht; sie gehörten alle derselben Race an und wurden nach dem Wurf unter gleichen Bedingungen gehalten und genau beobachtet. Da eventuell der Lactationsproceß von Einfluß auf die Involution sein könnte, wurde der Wurf sofort entfernt, um auch in dieser Beziehung bei allen Thieren gleiche Bedingungen zu schaffen.

Von jedem Stadium habe ich mehrere Uteri untersucht und von jedem Uterus wieder Schnitte aus mehreren Höhen gemacht, so daß die in meiner Tabelle (pag. 38) angeführ-

ten Zahlen das Mittel von mindestens 9 Messungen repräsentieren.

Als „normal“ fah ich die Uteri von Thieren an, die mindestens 2 Monate nicht trächtig waren; solche Uteri einerseits, und Uteri „gleich nach dem Wurf“ andererseits sind die beiden Endglieder meiner Präparatenreihe, und habe ich sie in gröfserer Anzahl als die Zwischenglieder untersucht.

Meine Bemühungen gingen dahin, folgende Fragen zu beantworten:

1.) Treten überhaupt Veränderungen an dem untersuchten Bindegewebe bei der puerperalen Involution ein?

und wenn dieses der Fall,

2.) Welcher Art sind die qualitativen,

3.) Welcher Art die quantitativen Veränderungen?

4.) Läßt sich aus dem Verhalten des Bindegewebes Etwas entnehmen zur Beantwortung der Frage, ob der involvirte Uterus in der That, wie Heschles annimmt, ein ganz neues Organ sei?

Untersuchungsbefunde.

A. Histologische Befunde.

I. Uterus gleich nach dem Wurfe.

(Fig. 1.)

Bei schwacher (c. 120 facher) Vergrößerung erscheint die Serosa sehr breit; sie liegt der äußeren Muskelschicht locker an und hebt sich an vielen Stellen des Präparats von ihr ab.

Von der Serosa gehen kräftige Bindegewebszüge ab, die die äußere, — längsverlaufende, — Schicht der Musculatur durchziehen. Nach einer leichten Krümmung beim Abgange von der Serosa bleiben sie, soweit das Auge sie verfolgen kann, fast gerade; nirgends sieht man an ihnen stärker ausgesprochene Schlängelungen oder wellenförmigen Verlauf; ferner zeigen sie nur beim Abgehen von der Serosa eine Anschwellung, im späteren Verlaufe haben sie bis an's Ende fast parallele Contouren. Beim Abgehen von der Serosa haben sie ein dichteres Gefüge als diese, weshalb sie mehr Farbstoff aufnehmen und dunkler tingirt erscheinen. Die Züge enden in breiten Büscheln von feinen Fasern, und gehen diese Endfasern in die Bindegewebschicht über, welche zwischen der äußeren, — längsverlaufenden, — Muskelschicht und der unter ihr liegenden sich findet. Die breiten Hauptzüge sind nur ausnahmsweise durch kräftige Bindegewebszüge anastomotisch mit einander verbunden. Durch diese Anastomosen werden weite Fächer gebildet, in welche die hypertrophische Musculatur eingebettet ist.

Das Uterushorn als Ganzes zeigt an seiner Oberfläche längsziehende Furchen, die ihm ein kannelirtes Aussehen verleihen. Auf dem Querschnitt sieht man nun in dem in Fig. 1 abgebildeten Präparate, entsprechend der Kannelirung, eine feichte, breite Einziehung; die Serosa ist in der Tiefe dieser Einziehung sehr breit, und locker gefügt, während sie sich zu Seiten der Einziehung bedeutend verschmälert. Die aus der Tiefe der Furche abgehenden Bindegewebszüge sind etwa doppelt so breit, wie die, welche seitlich abgegeben werden.

Mit starker Vergrößerung (c. 400 facher und mit homogener Oelimmersion, Reichard $\frac{1}{12}$) findet man folgende Verhältnisse: In der Serosa, sowie in den von ihr abgehenden Zügen erscheint normales Bindegewebe, in welchem die Faserung sehr deutlich ausgeprägt ist; die Faserbündel, ja selbst die einzelnen Fasern lassen sich scharf verfolgen. Die einzelnen Fasern erscheinen wie gequollen und sind auffallend stark.

In dem Gewebe liegen reichliche, große, spindelförmige Bindegewebskörperchen mit Kernen und Kernkörperchen. Am äußern Rande der Serosa sitzen große Endothelzellen auf, die auf dem Querschnitt spindelförmig mit starker mittlerer Anschwellung erscheinen.

Bei der Betrachtung der Musculatur des gefroren geschnittenen frischen Präparates sieht man in ihr eine Menge Fettkörnchen, die durch Ueberosmiumsäure schwarz gefärbt werden. Dieser Befund entspricht der bekannten Thatfache, daß die Musculatur des Uterus bereits am Ende der Gravidität der fettigen Degeneration anheimfällt.

Im Bindegewebe und Endothel der Serosa ist in diesem Stadium nirgends Fett zu finden.

II. Normaler Uterus.

(Fig. 3.)

Die Serofa ist viel schmaler, als in dem zuerst beschriebenen Präparate; ihr Gewebe ist fest gefügt und nirgends von der Unterlage abgehoben. Die der Kannelirung entsprechenden Einziehungen sind viel tiefer und steiler als bei I, und ist die Verbreiterung der Serofa an diesen Stellen nicht so auffällig, wie dort.

Was die abgehenden Hauptzüge des Bindegewebes betrifft, so liegen sie eng gedrängt an einander, zeigen einen stärker geschlängelten Verlauf und sind durch reichliche, kräftige Züge anastomotisch mit einander verbunden, sodafs viel mehr, freilich auch viel kleinere Fächer für die Musculatur gebildet werden, als dieses bei I der Fall war. Auffallend ist, dafs, während die Serofa bei I viel breiter ist als bei II, dieses bei den Bindegewebszügen nicht der Fall ist, deren Breite nur beim Abgang aus der Tiefe der beschriebenen Einziehungen bei I bedeutend gröfser ist als bei II.

Bei starker Vergröfserung erscheint das Bindegewebe deutlich faferig mit welligem Verlauf. Die Faferung läfst sich ebenso deutlich verfolgen wie bei I, doch macht sie einen andern Eindruck: haben wir dort die Fafer als gequollen bezeichnet, so ist sie hier trocken, zart und fest gefügt.

Die Bindegewebskörperchen sind nicht sehr zahlreich, — in der Serofa zahlreicher als in den Zügen.

Am äufsern Rande liegen die Zellen des peritonealen Endothels; sie sind entschieden kleiner als bei I.

III. 24—30 Stunden nach dem Wurfe.

Es ist beim ersten Blick gleich auffallend, um wie viel die Serosa schmaler ist als bei I, obgleich zwischen den beiden Stadien nur eine kurze Zeit liegt. Nicht nur in der Breite, sondern auch in Bau und Beschaffenheit ihres Gewebes nähert sie sich vielmehr der des normalen Uterus; nirgends ist die Serosa von der Unterlage abgehoben; die Einziehungen sind tief und steil.

Die Züge sind in ihrem geraden, wenig geschlängelten Verlauf, in der geringen Zahl der Anastomosen, mehr denen bei I ähnlich; dasselbe gilt von der Grösse und Zahl der Muskelfächer.

Die Immersionslinse zeigt verschiedene interessante Veränderungen am Bindegewebe dieses Präparats:

Was zunächst die Bindegewebsfasern betrifft, so ist das Bild ein ganz anderes, wie es bei I war. An mehreren Stellen der Präparate lässt sich die Faserung wol noch wahrnehmen, an den allermeisten aber ist sie verschwunden, und bietet die Serosa an diesen Stellen das Bild eines homogenen Gewebes dar, in dem die Bindegewebskörperchen eingelagert sind; diese Veränderung tritt gleich deutlich an den in Chromsäure und Alkohol gehärteten, wie an den frischen, gefroren geschnittenen Präparaten hervor.

Die zweite, nicht minder deutlich hervortretende Veränderung nehmen wir an den zelligen Elementen des Bindegewebes wahr: an feinen mit dem Gefrierapparat angefertigten Schnitten des frischen Objects sehen wir das Protoplasma der Bindegewebskörperchen in der unmittelbaren Umgebung der Kerne von Fetttropfchen durchsetzt. Durch Ueberosmiumsäure werden diese Partien schwarz gefärbt.

Auch in den Endothelzellen der Serosa tritt die fettige Degeneration deutlich hervor, und zwar ist sie an ihnen deutlicher noch ausgesprochen, als an den zelligen Elementen des Bindegewebes; im Bindegewebe nimmt sie von der Peripherie zum Centrum des Uterus an Intensität ab.

Die Form der Bindegewebskörperchen an den frischen Präparaten zeigt keine Abweichung von der in I beschriebenen; auch quantitativ tritt kein Unterschied irgend deutlich hervor.

Die Muskulatur zeigt hochgradige fettige Entartung.

IV. Zwei Tage nach dem Wurf.

(Fig. 2.)

Mit der schwachen Vergrößerung sieht man nur, daß die Verhältnisse in Bezug auf die Breite der Serosa, Anordnung und Verlauf der Bindegewebszüge, Breite der Muskelfächer, sich immer mehr von I entfernen, um sich II zu nähern.

Die Immersionslinse zeigt, daß die Faserung des Bindegewebes fast völlig geschwunden ist; in dem homogenen Gewebe liegen die Bindegewebskörperchen, die viel weniger zahlreich sind, als im Präparate I; konnte man sie dort im Gesichtsfelde oft nur schwer zählen, so findet man im vorliegenden Präparate meist nicht mehr als 20—25 im Gesichtsfelde.

Der fettige Zerfall ist viel deutlicher ausgesprochen, als im letztbeschriebenen Bilde; die Kerne sind mit Fettkörnchen ganz ausgefüllt und zeigen eine veränderte Gestalt; früher waren sie oblong und hatten eine regelmässige Contour, jetzt sieht man an vielen derselben unregelmässige Einziehungen, die an einzelnen zu tiefen Furchen werden.

An diesem Präparate kann ferner ein Befund constatirt werden, der am vorigen, wo die Verfettung noch nicht so intensiv und ausgedehnt war, nicht mit Sicherheit eruiert werden konnte: in jedem Gesichtsfelde der verschiedenen Präparate sieht man unter den verfetteten, von dem Reagens deutlich schwarz gefärbten zelligen Elementen auch mehrere völlig unveränderte, die sich garnicht von denen im Bindegewebe des Uterus gleich nach dem Wurfe unterscheiden; sie zeigen keine Fetttröpfchen in ihrem Kerne und keine Einziehungen an ihrem Rande. Dieser Befund, dem ich grofse Wichtigkeit beimafse, wurde wiederholt an den Präparaten geprüft.

An den nicht zelligen Elementen des Gewebes zeigt sich nirgends fettige Entartung.

Das Peritonealendothel ist durchweg fettig degenerirt.

V, VI, VII. Drei, vier, fünf Tage nach dem Wurfe.

Bei schwacher Vergröfserung ist es fast unmöglich, die Bilder dieser Tage von einander, und sehr schwer, sie vom normalen Uterus zu unterscheiden. Am deutlichsten tritt hervor, wie die Züge immer näher an einander rücken, immer weniger geraden Verlauf zeigen, und wie, beim deutlichen Hervortreten der anastomotisch verknüpfenden Züge, die Muskelfächer an Zahl immer zu-, an Breite abnehmen.

Den auffälligsten Befund bietet noch immer die veränderte Beschaffenheit der Bindegewebsfaser dar; doch kann man am 5. Tage, wol nicht in der Serosa, aber in den abgehenden Zügen wieder deutlicher die Faserbündel verfolgen, die hier und dort in der homogenen Masse schärfer contou-

hervortreten; die wieder auftretende Faerbung ist zum Centrum hin deutlicher, als in der Peripherie.

Am vierten Tage tritt schon die Verfettung recht zurück: man sieht im Gesichtsfelde mehr Kerne ohne Fetttröpfchen und mit geraden Contouren, als die früher beschriebenen veränderten Gebilde. Die Zahl der Bindegewebskörperchen ist am fünften Tage kaum verschieden von der beim normalen Uterus.

An dem Peritonealendothel nimmt die fettige Entartung ab: man sieht schon viele Zellen ohne Fetttröpfchen. In der Musculatur ist die Verfettung noch deutlich ausgesprochen.

VIII, IX. Sechs und sieben Tage nach dem Wurfe.

Die schwache Vergrößerung ergibt gar keinen Unterschied vom Bilde des normalen Uterus.

Mit der Immerfionslinse gelang es mir nicht, an den Präparaten dieser beiden Tage irgendwo fettigen Zerfall nachzuweisen.

Die Faerbung ist am siebenten Tage wieder ganz deutlich und unterscheidet sich von der bei I. beschriebenen ebenso, wie die Faerbung des Bindegewebes im normalen Uterus.

Die zelligen Elemente sind an Zahl und Beschaffenheit denen des normalen Uterus gleich.

Bemerkt sei, daß am 7. Tage auch in der Musculatur kein Fett mehr gefunden wurde.

Wir haben an beiden Bestandtheilen des Bindegewebes, an den Bindegewebskörperchen und an der Bindegewebsfaser histologische Veränderungen gefunden.

An den Bindegewebskörperchen sehen wir schon einen Tag nach dem Wurf fettige Entartung eintreten, die sowohl die Umgebung der Kerne, wie die Kerne selbst betrifft. Diese Verfettung wird am 2. und 3. Tage immer ausgedehnter und deutlicher und die Kerne der von ihr betroffenen Körperchen verändern ihre Gestalt. Am 4. Tage tritt die Entartung schon zurück, am 6. Tage konnte sie nicht mehr gefunden werden.

Am 2. Tage nach dem Wurf konnte deutlich eine Abnahme der Zahl der Körperchen wahrgenommen werden; am 5. Tage war ihre Menge ungefähr der im Bindegewebe des normalen Uterus gleich.

Wir haben also an der Serosa und den von ihr abgehenden Zügen des Bindegewebes dieselbe Veränderung gefunden, die frühere Untersucher an der Musculatur und Schleimhaut des puerperalen Uterus entdeckt haben: die fettige Entartung, und zwar allein der zelligen Elemente des Bindegewebes, nirgends der Bindegewebsfafer.

Wir haben ferner gefunden, daß das Peritonealendothel, an dem Kilian schon die Verfettung beobachtet hat, früher und stärker degenerirt, als das von mir untersuchte Bindegewebe. Dasselbe gilt in Bezug auf die Musculatur, in der ja schon am Ende der Schwangerschaft fettige Entartung nachgewiesen ist, und in der wir die Degeneration noch beobachten konnten, als sie im Bindegewebe bereits abgelaufen war. —

Die fettige Entartung kann überall auftreten, wo immer sich ein Mißverhältniß zwischen den zu ernährenden Geweben und der Ernährungsflüssigkeit einstellt; dieses Verhältniß ist im Puerperium entschieden eingetreten: durch Obliteration, durch Compression in Folge der Wehen sind viele Blutwegefunc-

tionsunfähig geworden, und in Folge davon wird den Zellen nicht mehr genügend Sauerstoff zugeführt. Nach Liebig's Lehre, die dann von Hoppe-Seyler, Fürstenberg, Voit und Pettenkofer weiter ausgebildet wurde, müssen wir uns nun den Vorgang so vorstellen, daß bei der ungenügenden Verbrennung in den Zellen selbst aus dem Eiweiß direct das Fett entsteht.

Das Bindegewebe hypertrophirt während der Schwangerschaft, wie wir gleich aus unseren Messungen ersehen werden, weniger als die Musculatur; in ihm muß also auch im Puerperium das Mißverhältniß zwischen der zu ernährenden Gewebsmasse und der ernährenden Flüssigkeit weniger scharf hervortreten; — dieses zeigt uns der histologische Befund: in der Serosa tritt die fettige Degeneration weit weniger hervor, als in der Musculatur, und weicht auch früher der normalen Gewebsbeschaffenheit.

Auf die Frage nach der Regeneration der Bindegewebskörperchen haben wir keine Antwort aus unseren mikroskopischen Untersuchungen.

Bei der Betrachtung der Bindegewebsfasern fanden wir, daß ihre Beschaffenheit im normalen Uterus, im Uterus gleich nach dem Wurf und in dem 24 Stunden nach dem Wurf eine verschiedene ist.

Unschwer läßt sich das verschiedene Aussehen in den beiden erstgenannten Stadien deuten. Das Bindegewebe wird bekanntlich durchtränkt von geringen Mengen einer Flüssigkeit, in der wir die Ernährungs- und Zersetzungstoffe des Gewebes zu vermuthen haben (Frey). Aus den Blutgefäßen transsudirt, sendet sie ihre Ueberschüsse in die das Bindegewebe einnehmenden Anfangscanäle des Lymphsystems. Bei der mächtigen Hypertrophie der Blutbahnen am Ende der Schwangerschaft erscheint es nun ganz folge-

richtig, daß auch die Masse des Transsudats eine größere wird, und ist dieses, glaube ich, der Grund des gequollenen Aussehens der Bindegewebsfasern des Uterus gleich nach dem Wurf, im Gegensatz zur trockenen, festen Faferung im normalen Uterus.

Ganz unerklärlich ist mir aber der Befund an der Bindegewebsfaser in den Zwischenstadien, — das homogene, an embryonales Bindegewebe erinnernde Aussehen, — geblieben. Daß es kein zufälliger Befund, sondern ein dem Puerperium eigenthümlicher ist, ist zweifellos, da er an allen Präparaten vom ersten bis zum fünften Tage nach dem Wurf constatirt wurde. Vielleicht hat die Vermuthung, daß diese Veränderungen mit dem Zerfall und der spätern Restitution der körperlichen Elemente des Bindegewebes im Zusammenhang stehen, insofern einige Berechtigung, als letztere von den zwei Formelementen des Bindegewebes doch wol als die physiologisch thätigeren und wichtigeren angesehen werden müssen.

Aus unseren mikroskopischen Befunden haben wir noch kurz einen Punkt zu berühren: ob nämlich aus dem Verhalten des Bindegewebes des puerperalen Uterus sich Etwas entnehmen läßt zur Beantwortung der Frage, ob der involvirte Uterus ein ganz neues Organ sei, wie es Hefchl, wenigstens in Bezug auf die Musculatur behauptet, oder ob hauptsächlich eine Atrophie der in der Schwangerschaft hypertrophirten Theile eintrete? Wir können mit Bestimmtheit sagen, daß eine nicht unbedeutende Anzahl von Bindegewebskörperchen der fettigen Degeneration nicht anheim fallen, da der Befund ziemlich vieler intacten Körperchen bei sonst stark ausgeprägter fettiger Degeneration dieser Gebilde mit Sicherheit constatirt wurde. Daraus läßt sich wol schließen, daß die Serosa und das Binde-

gewebsgerüst der musculären Uteruswand im involvirten Uterus nicht durchaus neue Gebilde sind; ein Analogieschluss auf die Musculatur erscheint aber unzulässig, da in der Musculatur nach der Geburt die Ernährungsstörung eine viel bedeutendere ist, als im Bindegewebe, welches in der Gravidität weniger zunimmt und weniger reichlich ernährt wird. Demnach ist es auch durchaus möglich, dass vom alten Bindegewebe vieles nach dem Puerperium persistirt, während die Musculatur vollständig der fettigen Degeneration anheimfällt. In dieser Ansicht wird man bestärkt, wenn man am zweiten oder dritten Tage nach dem Wurf im Mikroskop die durch Ueberosmiumsäure total schwarz gefärbten Muskelbündel ansieht, zwischen denen die hellen Bindegewebszüge mit eingestreuten schwarzen Bindegewebskörperchen verlaufen.

B. Messungen.

Im Folgenden erlaube ich mir die Resultate meiner Messungen mit dem Planimeter und mit dem Mikrometerocular anzuführen. Die Methode, die ich bei den Messungen anwandte, ist in der Einleitung beschrieben; für die Messungen mit dem Mikrometerocular möchte ich nur noch anführen, daß bei der Bestimmung der Breite der Serosa, und der Länge und Breite der Bindegewebszüge ich die ersten 4, resp. 3 Messungen an den Stellen ausführte, wo die Serosa in den beschriebenen Einziehungen, resp. die Bindegewebszüge beim Abgehen aus diesen Einziehungen die größte Breite zeigen; die diesen Messungen entsprechenden Zahlen sind eingeklammert.

I. Uterus gleich nach dem Wurfe.

12 Messungen mit dem Planimeter ergaben folgende Zahlen:

In 1 Quadrat-Cm. Fläche ist enthalten Bindegewebe:

0,21 Q.-Cm.

0,19 "

0,14 "

0,17 "

0,16 "

0,15 "

0,18 "

0,17 "

0,16 "

0,15 "

0,15 "

0,14 "

ergibt im Mittel **0,16 Q.-Cm.**

also verhält sich die Bindegewebsfläche zur Gesamtfläche wie **1 : 6,25.**

Je 12 Messungen mit dem Mikrometerocular ergaben folgende Zahlen ¹⁾:

Breite der Serosa	Breite der Hauptzüge	Länge der Hauptzüge
0,19 mm.	0,08 mm.	1,2 mm.
0,16 "	0,08 "	1,2 "
0,18 "	0,07 "	1,2 "
0,17 "	0,06 "	1,1 "
0,11 "	0,05 "	1,1 "
0,09 "	0,04 "	1,0 "
0,11 "	0,03 "	0,9 "
0,08 "	0,02 "	1,0 "
0,10 "	0,02 "	0,9 "
0,10 "	0,02 "	0,8 "
0,11 "	0,01 "	1,0 "
0,08 "	0,01 "	0,8 "
1,48 : 12	0,49 : 12	12,2 : 12
= 0,123	= 0,040	= 1,016.

1) Ich habe trotz der bedeutenden Differenz der ersten 4, resp. 3 Messungen von den übrigen, das Mittel aus allen gezogen, da es mir weniger auf die absoluten Zahlen als auf den Vergleich der Resultate der Messungen in den verschiedenen Stadien ankam.

II. Uterus einen Tag nach dem Wurfe.

9 Messungen mit dem Planimeter ergaben folgende Zahlen:

In 1 Quadrat-cm. Fläche ist enthalten Bindegewebe:

0,24 Q.-Cm.

0,18 "

0,22 "

0,17 "

0,23 "

0,22 "

0,19 "

0,20 "

0,20 "

ergibt im Mittel **0,20** Q.-Cm.

also verhält sich die Bindegewebsfläche zur Gesamtfläche wie **1 : 5,00**.

Je 9 Messungen mit dem Mikrometerocular ergaben folgende Zahlen:

Breite der Serosa	Breite der Hauptzüge	Länge der Hauptzüge
{ 0,09 mm.	{ 0,05 mm.	0,8 mm.
{ 0,07 "	{ 0,04 "	1,0 "
{ 0,07 "	{ 0,035 "	0,5 "
0,03 "	0,03 "	0,9 "
0,05 "	0,025 "	0,8 "
0,05 "	0,03 "	0,7 "
0,05 "	0,025 "	1,0 "
0,04 "	0,015 "	1,1 "
0,05 "	0,01 "	0,6 "
0,50 : 9	0,26 : 9	7,4 : 9
= 0,055	= 0,029	= 0,822

III. Uterus zwei Tage nach dem Wurfe.

9 Messungen mit dem Planimeter ergaben folgende Zahlen:

In 1 Quadrat-Cm. Fläche ist enthalten Bindegewebe:

0,28 Q.-Cm.

0,26 "

0,22 "

0,21 "

0,24 "

0,23 "

0,24 "

0,26 "

0,22 "

ergibt im Mittel **0,24** Q.-Cm.

also verhält sich die Bindegewebsfläche zur Gesamtfläche wie **1 : 4,17**.

Je 9 Messungen mit dem Mikrometerocular ergaben folgende Zahlen:

Breite der Serosa	Breite der Hauptzüge	Länge der Hauptzüge
{ 0,07 mm.	{ 0,05 mm.	0,65 mm.
{ 0,06 "	{ 0,04 "	1,0 "
{ 0,05 "	{ 0,035 "	0,45 "
0,045 "	0,025 "	0,8 "
0,035 "	0,025 "	0,55 "
0,04 "	0,015 "	0,9 "
0,03 "	0,02 "	1,0 "
0,02 "	0,02 "	0,5 "
0,03 "	0,01 "	0,45 "
0,38 : 9	0,24 : 9	6,39 : 9
= 0,042	= 0,027	= 0,7

IV. Uterus drei Tage nach dem Wurfe.

9 Messungen mit dem Planimeter ergaben folgende Zahlen:

In 1 Quadrat-Cm. Fläche ist enthalten Bindegewebe:

0,31 Q.-Cm.

0,26 "

0,25 "

0,23 "

0,24 "

0,26 "

0,27 "

0,29 "

0,24 "

ergibt im Mittel **0,26** Q.-Cm.

also verhält sich die Bindegewebsfläche zur Gesamtfläche wie **1 : 3,85**.

Je 9 Messungen mit dem Mikrometerocular ergaben folgende Zahlen:

Breite der Serosa	Breite der Hauptzüge	Länge der Hauptzüge
{ 0,08 mm.	{ 0,06 mm.	0,9 mm.
{ 0,065 "	{ 0,045 "	0,7 "
{ 0,05 "	{ 0,035 "	1,0 "
0,035 "	0,03 "	0,5 "
0,045 "	0,025 "	0,4 "
0,035 "	0,015 "	0,35 "
0,03 "	0,03 "	0,25 "
0,04 "	0,01 "	0,4 "
0,02 "	0,02 "	0,7 "
0,40 : 9	0,27 : 9	5,2 : 9
= 0,044	= 0,03	= 0,58

V. Uterus vier Tage nach dem Wurf.

9 Messungen mit dem Planimeter ergaben folgende Zahlen:

In 1 Q.-Cm. Fläche ist enthalten Bindegewebe:

0,30 Q.-Cm.

0,26 „

0,29 „

0,26 „

0,24 „

0,26 „

0,22 „

0,31 „

0,23 „

ergibt im Mittel 0,26 Q.-Cm.

also verhält sich die Bindegewebsfläche zur Gesamtfläche wie 1 : 3,85.

Je 9 Messungen mit dem Mikrometerocular ergaben folgende Zahlen:

Breite der Serosa. Breite der Hauptzüge. Länge der Hauptzüge.

{ 0,06 mm.	{ 0,04 mm.	0,6 mm.
{ 0,05 „	{ 0,04 „	0,7 „
{ 0,05 „	{ 0,035 „	0,5 „
0,04 „	0,03 „	0,65 „
0,03 „	0,02 „	0,4 „
0,035 „	0,025 „	0,8 „
0,025 „	0,02 „	0,2 „
0,02 „	0,01 „	0,25 „
0,02 „	0,01 „	0,5 „
0,33 : 9	0,23 : 9	4,6 : 9
= 0,037	= 0,025	= 0,51

VI. Uterus fünf Tage nach dem Wurfe.

9 Messungen mit dem Planimeter ergaben folgende Zahlen:

In 1 Q.-Cm. Fläche ist enthalten Bindegewebe:

0,47 Q.-Cm.

0,42 „

0,41 „

0,46 „

0,38 „

0,42 „

0,35 „

0,27 „

0,26 „

ergibt im Mittel **0,38 Q.-Cm.**

also verhält sich die Bindegewebsfläche zur Gesamtfläche wie **1 : 2,63.**

Je 9 Messungen mit dem Mikrometerocular ergaben folgende Zahlen:

Breite der Serosa.	Breite der Hauptzüge.	Länge der Hauptzüge.
{ 0,07 mm.	{ 0,045 mm.	0,8 mm.
{ 0,06 „	{ 0,045 „	0,7 „
{ 0,055 „	{ 0,04 „	0,6 „
0,04 „	0,02 „	0,8 „
0,035 „	0,025 „	0,3 „
0,035 „	0,025 „	0,7 „
0,025 „	0,02 „	0,5 „
0,02 „	0,015 „	0,25 „
0,02 „	0,005 „	0,25 „
0,36 : 9	0,24 : 9	4,9 : 9
= 0,04	= 0,027	= 0,54

VII. Uterus sechs Tage nach dem Wurfe.

9 Messungen mit dem Planimeter ergaben folgende Zahlen:

In 1 Q.-Cm. Fläche ist enthalten Bindegewebe:

0,40 Q.-Cm.

0,46 „

0,44 „

0,39 „

0,47 „

0,40 „

0,41 „

0,37 „

0,42 „

ergibt im Mittel **0,42** Q.-Cm.

also verhält sich die Bindegewebsfläche zur Gesamtfläche wie **1 : 2,38**.

Je 9 Messungen mit dem Mikrometerocular ergaben folgende Zahlen:

Breite der Serosa. Breite der Hauptzüge. Länge der Hauptzüge.

{ 0,07 mm.

{ 0,05 „

{ 0,05 „

0,035 „

0,02 „

0,03 „

0,025 „

0,02 „

0,02 „

0,32 : 9

= **0,035**

{ 0,04 mm.

{ 0,04 „

{ 0,035 „

0,025 „

0,025 „

0,02 „

0,02 „

0,015 „

0,01 „

0,23 : 9

= **0,025**

0,7 mm.

0,65 „

0,5 „

0,45 „

0,6 „

0,8 „

0,35 „

0,25 „

0,4 „

4,7 : 9

= **0,52**

VIII. Uterus sieben Tage nach dem Wurf.

9 Messungen mit dem Planimeter ergaben folgende Zahlen:

In 1 Q.-Cm. Fläche ist enthalten Bindegewebe:

0,45	Q.-Cm.
0,39	„
0,39	„
0,44	„
0,46	„
0,40	„
0,38	„
0,37	„
0,43	„

ergibt im Mittel **0,41** Q.-Cm.

also verhält sich die Bindegewebsfläche zur Gesamtfläche wie **1 : 2,44**.

Je 9 Messungen mit dem Mikrometerocular ergaben folgende Zahlen:

Breite der Serosa.	Breite der Hauptzüge.	Länge der Hauptzüge.
{ 0,07 mm.	{ 0,04 mm.	0,8 mm.
{ 0,055 „	{ 0,04 „	0,7 „
{ 0,055 „	{ 0,035 „	0,5 „
0,04 „	0,02 „	0,65 „
0,035 „	0,025 „	0,45 „
0,035 „	0,015 „	0,7 „
0,02 „	0,01 „	0,35 „
0,02 „	0,02 „	0,35 „
0,02 „	0,015 „	0,2 „
0,35 : 9	0,22 : 9	4,6 : 9
= 0,039	= 0,024	= 0,51

IX. Normaler Uterus.

12 Messungen mit dem Planimeter ergaben folgende Zahlen:

In 1 Quadrat-Cm. Fläche ist enthalten Bindegewebe:

0,46 Q.-Cm.

0,42 „

0,38 „

0,44 „

0,39 „

0,43 „

0,41 „

0,42 „

0,39 „

0,44 „

0,37 „

0,42 „

ergibt im Mittel **0,41** Q.-Cm.

also verhält sich die Bindegewebsfläche zur Gesamtfläche wie **1 : 2,44**.

Je 12 Messungen mit dem Mikrometerocular ergeben folgende Zahlen:

Breite der Serosa	Breite der Hauptzüge	Länge der Hauptzüge
0,07 mm.	0,04 mm.	0,8 mm.
0,06 „	0,04 „	0,8 „
0,055 „	0,04 „	0,7 „
0,05 „	0,035 „	0,5 „
0,03 „	0,025 „	0,6 „
0,035 „	0,02 „	0,65 „
0,03 „	0,025 „	0,35 „
0,025 „	0,015 „	0,35 „
0,02 „	0,01 „	0,4 „
0,025 „	0,01 „	0,2 „
0,02 „	0,02 „	0,25 „
0,04 „	0,02 „	0,5 „
0,46 : 12 = 0,038	0,30 : 12 = 0,025	6,1 : 12 = 0,51

Aus vorstehenden Messungen ersehen wir, dass im Bindegewebe des Uterus während des Puerperiums quantitative Veränderungen eintreten; zur klaren Uebersicht über dieselben diene folgende Tabelle.

Stadium.	Breite der Serosa.	Breite der Hauptzüge.	Länge der Hauptzüge.	In 1 Q.-Cm. Fläche beträgt d. Bindegewebsfläche	Die Bindegewebsfl. verhält sich zur Gesmtfl. wie 1 :
Gleich nach d.	mm.	mm.	mm.	Q.-Cm.	
Wurf	0,123	0,040	1,016	0,16	6,25
1 Tag	0,055	0,029	0,822	0,20	5,00
2 Tage	0,042	0,027	0,7	0,24	4,17
3 Tage	0,044	0,03	0,58	0,26	3,85
4 Tage	0,037	0,025	0,51	0,26	3,85
5 Tage	0,04	0,027	0,54	0,38	2,63
6 Tage	0,035	0,025	0,52	0,42	2,38
7 Tage	0,039	0,024	0,51	0,41	2,44
Norm. Uterus.	0,038	0,025	0,51	0,41	2,44

Die Zahlen der drei ersten Columnen unserer Tabelle zeigen uns eine absolute Abnahme des Bindegewebes im Puerperium: die Serosa des normalen Uterus beträgt nur ein Drittel der Breite der Serosa des Uterus gleich nach dem Wurf; die Breite und Länge der Hauptzüge des Bindegewebes des ersteren ergeben die Hälfte der Masse des letzteren. —

Die Zahlen der ersten Columnne ergeben aber besonders deutlich noch ein interessantes Resultat: schon zwei Tage nach dem Wurf ist die Serosa des puerperalen Uterus fast ebenso breit, wie die des normalen, und bleibt, mit unbedeutenden Schwankungen, gleich. Im Gegensatz dazu ergeben die Messungen einen bedeutenden Unterschied zwischen der Breite der Serosa im Uterus gleich nach dem Wurf und im Uterus, der bereits 24—30 Stunden sich im Puerperium befindet.

Die Erklärung dieses Befundes ist wol folgende: Zur Untersuchung des Uterus „gleich nach dem Wurf“ wurde sorgfältig darauf geachtet, daß das Mutterthier sofort nach der Geburt getödtet werde. Der Uterus hatte daher nach der Entleerung seines Inhalts kaum Zeit sich zu contrahiren, und können daher wol die an ihm gefundenen Verhältnisse auf den Uterus auf der Höhe seiner Entwicklung in der Schwangerschaft bezogen werden. In dem folgenden Stadium (24 St. nach dem Wurf) haben schon Contraction der Wand nach Entleerung des Organs und Nachwehen eingewirkt, und in Folge dessen hat sich das elastische Gewebe der Serosa bedeutend zusammengezogen, sie ist schmaler geworden. Diese mechanischen Momente scheinen mir für die quantitativen Veränderungen des Peritonealüberzuges die bei weitem wichtigeren zu sein, da diese Veränderungen deutlich gerade nur in den ersten

24 Stunden auftreten, während derer die Nachwehen wol andauern, die histologischen Veränderungen dagegen, wie wir gesehen haben, weniger ausgesprochen sind, als dies in den nächsten 2 Tagen der Fall ist.

Das gleiche Resultat zeigen, weniger deutlich, die Zahlen der 2. und 3. Columnne.

Die Zahlen der 4. und 5. Columnne lehren uns, dafs die Menge des Bindegewebes im Puerperium relativ zur Menge der Muskulatur zunimmt; und zwar in recht bedeutendem Mafse. Die Zahlen zeigen ein ziemlich stetiges Zurückgehen zur Norm¹⁾.

Diese beiden letzten Columnnen haben mehr Werth für die Feststellung der relativen Vergrößerung der Bindegewebsmenge in der Schwangerschaft, als für das Studium der puerperalen Veränderungen des Bindegewebes.

Stellen wir nun das Resultat der drei ersten Columnnen: absolute Abnahme des Bindegewebes im Puerperium, neben das Resultat der zwei letzten Columnnen: relative Zunahme der Bindegewebsmenge im Puerperium, — so ergibt sich der Schlusssatz: das Bindegewebe des Uterus atrophirt im Puerperium in geringerem Mafse als die Muskulatur.

Ferner gestatten unsere Messungen den weiteren indirecten Schlufs: das Bindegewebe nimmt in der Schwangerschaft in geringerem Mafse zu, als die Muskulatur.

1) Frappirend ist der starke Sprung am 5. Tage; ich habe an 2 Uteri und 6 Schnitten an diesem Tage bedeutende Abweichungen gegen den vorigen bei den Messungen mit dem Planimeter gefunden, es aber unterlassen, genauer der Sache nachzuforschen, da die Messungen mit dem Mikrometerocular an diesem Tage keinerlei auffällige Veränderungen ergaben.

Betrachten wir unsere Tabelle noch darauf hin, wann die Zahlen wieder der Norm entsprechen, so geben die 3 ersten Columnen einen von dem der zwei letzten verschiedenen Aufschluss. Während die Breite der Serosa, die Länge und Breite der Bindegewebszüge schon 2—3 Tage nach dem Wurf vollständig oder nahezu der Norm entsprechen, so ist das Verhältniß zwischen der Menge des Bindegewebes und der Muskulatur erst am 6. Tage das normale. Der Grund dafür liegt wol darin, daß die in den ersten Columnen dargestellten Verhältnisse hauptsächlich durch die angeführten mechanischen Factoren hervorgebracht werden, während die Zahlen der letzten zwei Columnen zum großen Theil durch die in der Muskulatur sich lebhaft abspielenden histologischen Vorgänge bedingt sind.

Jedenfalls ergeben die Messungen mit dem Planimeter in gleicher Weise, wie die mikroskopische Untersuchung, daß die Serosa des Kaninchen-Uterus am sechsten Tage nach dem Wurf den Involutionsproceß durchgemacht hat.



THESEN.

1. Mit der Axenzugzange extrahirte Kinder sind, wenn lebend geboren, baldigem Tode geweiht.
 2. Die besten therapeutischen Resultate bei der katarrhalischen Pneumonie der Kinder erzielt man mit der feuchten Wärme.
 3. In der Kinder-Chirurgie soll die Carbol säure nur mit größter Vorsicht angewandt werden.
 4. Ein Jodoformtampon wirkt bei acuten Entzündungen der weiblichen Genitalien sehr gut analgetisch.
 5. Die Uterussonde ist nur zum Constatiren der Beschaffenheit des Endometriums unentbehrlich.
 6. Die häufigste Ursache kinderloser Ehen ist eine chronische Gonorrhoe des Mannes.
 7. Alle Erscheinungen der Lepra lassen sich einheitlich als pathologische Veränderungen des Bindegewebes auffassen.
-

Fig. I.




Fig. II.




Fig. III.

